



Diaproof™ Pro

Elektrolytblandning för kalvar, föl, lamm och killingar. Oralt pulver.

Stabilisering av vätske- och elektrolytbalansen för att stödja matsmältningen vid mag- och tarmproblem



Produktfakta

Innehåller elektrolyter (natriumklorid, magnesiumhydroxid, natriumvätekarbonat, natriumcitrat, kaliumklorid), glukos, växtfibrer (psyllium), torrjäst och vitaminer.

Den speciella formulan med psyllium gör att det lösa tarminnehållet ombildas till en gel.

Tarminnehållet passerar långsammare genom tarmen och på så sätt säkerställs en bättre absorption av näringsämnen och vätska.

Dessutom fungerar gelén som en skyddande barriär på den skadade tarmslemhinnan.



Sammansättning

	Rekommendation	Diaproof™ Pro
Natrium (mmol/L)	80-110	107
Kalium (mmol/L)	10-30	26
Klorid (mmol/L)	40-80	64
Natriumvätekarbonat (mmol/L)	Min. 50	82
SID (mmol/L)*	Min. 60	69
Osmolaritet (mOsm/L)	250 - 350	303

*Strong Ion Difference (SID) beskriver en lösnings basiska effekt. Den spelar en väsentlig roll i korrigeringen av syra-basbalansen. SID beräknas som $[Na^+] + [K^+] - [Cl^-]$.

Användning

							
		Vatten vid 40°C	Diaproof™ Pro	Vatten eller mjölk vid 40°C	Diaproof™ Pro	Vatten vid 40°C	Diaproof™ Pro
1. utfodring	0 t	2 L	100 g	2 L	100 g	½ L	25 g
2. utfodring	+ 12 t	2 L	100 g	2 L	100 g	½ L	25 g
3. utfodring	+ 12 t	2 L	100 g	2 L	100 g	½ L	25 g

Blandning: 1 doseringssked (50 g) per 1 L ljummet vatten (40°C). Utfodras omedelbart efter blandning.

Utfodringsperiod: Upprepas var 12:e timme. Avföringskonsistensen förbättras oftast efter 3 utfodringar.

Små raser: 1 L per utfodring

Stora raser: 2 L per utfodring

Fråga din veterinär om råd vid avvikelser.

Förpackning 3 kg hink

Shaping the future
of animal health

